

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸料エキス錠

(ケイシブクリョウガン)

特徴

- 「桂枝茯苓丸」は、漢方の古典といわれる中国の医書「キンキョウリヤク金匱要略」の婦人妊娠病編に記載されている薬方です。
- のぼせや手足の冷えを伴う月経の痛み、しみ、肩こり、打ち身などに効果があります。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

(注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状を指します。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	3回
15才未満7才以上	1錠	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人1日の服用量6錠（1錠310mg）中、次の成分を含んでいます。

桂枝茯苓丸エキス（1/2量）……………1,150mg

〔ケイヒ・ブクリョウ・ボタンピ・トウニン・シャクヤク各2.0g〕
より抽出。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素、セルロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。なお、錠剤の表面に白い部分が見られる場合がありますが、これは添加物によるものです。

また本剤は、生薬精油成分（においのする成分）を含んだエキスを使用しておりますので、漢方薬特有のにおいがします。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わります。）

(4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<https://www.pmda.go.jp/>

☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334

受付時間 10:00~17:00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元

クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）