



錠剤

いつでもそばに

漢方セラピー



柴胡加竜骨牡蛎湯

T-2

サイコカリユウジツ
ボレイトウ

クラシエの漢方

ストレスなどで
イライラする
不眠の方に

神経症

体力中等度以上で、精神不安があって、
動悸、不眠、便秘などを伴う方

第2類医薬品



ビン入りの錠剤です。



T-2

このお薬の詳しい説明を
動画でチェック！

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように
大切に保管してください。

押して開ける

第2類
医薬品

販売名:柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠クラシエ

〈成分〉成人1日の服用量9錠(1錠400mg)中
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス……………1,950mg
サイコ2.5g、ハンゲ2.0g、ブクリョウ・ケイ
ヒ各1.5g、オウゴン・タイソウ・ニンジン・
リュウコツ・ボレイ各1.25g、ショウキョウ
0.4g、ダイオウ0.5gより抽出。

添加物として、タルク、クロスCMC-Na、
CMC-Ca、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セル
ロースを含有する。

(成分に関連する注意)本剤は天然物(生薬)のエキスを用
いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

〈効能〉体力中等度以上で、精神不安があつて、
動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症:
高血圧の随伴症状(動悸、不安、不眠)、神経症、
更年期神経症、小児夜泣き、便秘

〈用法・用量〉1日3回食前又は食間に水又は
白湯にて服用。

成人(15才以上)……1回3錠

15才未満5才以上…1回2錠

5才未満は服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)小児に服用させる場合に
は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

製造販売元

クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
の問合せ先

☎0120-149-931

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副
作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品
を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤
を服用する場合は授乳を避けてください

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登
録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦
又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な
人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸が
弱く下痢しやすい人(5)今までに薬などにより
発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可
能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりす ると息切れがする・息苦しくなる、空せ き、発熱等がみられ、これらが急にあら われたり、持続したりする。
肝機能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目 が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ 、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、
このような症状の持続又は増強が見られた場合には、
服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください 軟便、下痢
4. 1ヵ月位(小児夜泣き、便秘に服用する場合には1
週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください