

P

【効能効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

【用法用量】

次の量を、食前または食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1.7g	3回
15歳未満	服用しないでください	

添付のサジはすり切り1杯約1.7gです。

＜用法用量に関連する注意＞

用法用量を厳守してください。

【成分分量】

5g（1日量）中 日局炭酸水素ナトリウム 5g含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 紙容器は、においを吸収しやすいため、保管には注意してください。

＜貯法＞

気密容器。室温保存。

副作用被害救済制度の問合せ先
 （独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造番号

使用期限



袋 : PE
 スプーン : PS
 スプーン袋 : PP

P

制酸薬

日本薬局方

炭酸水素ナトリウム

Sodium Bicarbonate

500g

胃酸過多、胸やけなどに



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
 電話番号 06(6231)5626

第3類医薬品

（重曹）

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
 また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

制酸薬

日本薬局方

炭酸水素ナトリウム

（重曹）

Sodium Bicarbonate

500g

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 腎臓病の診断を受けた人。
2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

